



Quy định Chủng ngừa của Philadelphia để Nhập Trường (2017/2018)

Vắc xin được yêu cầu vào ngày đầu tiên đi học

Một trẻ phải được tiêm chủng ít nhất một liều cho tất cả các loại vắc xin, hoặc loại trừ nguy cơ

Một trẻ có thể có giấy miễn các mũi tiêm chủng này vì lý do y tế, tôn giáo, hoặc triết học

Ngay cả khi được miễn, một trẻ có thể không được đến trường trong đợt bùng phát bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin

Nếu một trẻ chưa tiêm chủng các liều được yêu cầu, thì trong vòng 5 ngày đầu tiên đi học, trẻ đó phải:

Tiêm chủng liều tiếp theo, nếu thích hợp về y tế

Có phụ huynh/người giám hộ cung cấp một kế hoạch y tế nếu liều tiếp theo không phải là liều cuối cùng trong đợt tiêm chủng

Có cha mẹ/người giám hộ cung cấp một kế hoạch y tế nếu liều tiếp theo không thích hợp về y tế

Được yêu cầu vào ngày đầu tiên đi học:

Mọi cấp lớp	Liều	Ghi chú
Uốn ván, bạch hầu, ho gà (DTP/Dtap/DT/Td, hoặc Tdap*)	4*	Liều thứ nhất lúc/sau 4 tuổi
Bại liệt (OPV/IPV)	4	Liều thứ 4 lúc/sau 4 tuổi, ít nhất 6 tháng sau liều trước đó
Sởi, quai bị, rubella (MMR/MMRV)	2	Lúc/sau 1 tuổi
Viêm gan B (HBV)	3	
Đậu mùa (Varicella/MMRV)	2	Lúc/sau 1 tuổi*

Lớp 7	Liều	Ghi chú
Vắc xin kết hợp ngừa viêm màng não cầu khuẩn (MCV4)	1	Lúc/sau 2 tuổi
Uốn ván, bạch hầu, ho gà (Tdap)	1	Lúc/sau 7 tuổi

Lớp 12	Liều	Ghi chú
Vắc xin kết hợp ngừa viêm màng não cầu khuẩn (MCV4)	2	Nếu liều thứ nhất được cho dùng lúc 16 tuổi hoặc sau đó, chỉ cần 1 liều để vào học lớp 12

* Chỉ cần 3 liều vắc xin chứa Td nếu bắt đầu đợt tiêm chủng lúc 7 tuổi hoặc sau đó, và tối thiểu một liều là Tdap

** Hoặc tài liệu chứng minh miễn dịch bằng xét nghiệm hoặc bản khai của phụ huynh, người giám hộ, hoặc bác sĩ